


6 มาตรการป้องกัน โรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา



มาตรการที่ 1 การจัดระบบสุขาภิบาลอาหาร



โรงอาหาร

เตรียม - ประคบ
และจัดเก็บอาหารสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร

อาหาร

ควรแยกเก็บเป็นสัดส่วน เก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
และต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง มีการปกปิด
และไม่ปรุงประกอบทิ้งไว้นานเกิน 2 ชั่วโมง
ก่อนนำมารับประทาน

ล้างภาชนะอุปกรณ์ให้สะอาด

ไม่ใช้ภาชนะรับประทานอาหาร
และน้ำ ร่วมกัน



ถังขยะ

ที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด



ห้องน้ำต้องสะอาด



ผู้เตรียม ปรุงประกอบ ซองส่ง เสิร์ฟ

แต่งกายสะอาด สวมเสื้อ
มีแขนสวมผ้ากันเปื้อน ใส่หมวกหรือเน็ตคลุม
เก็บผมเรียบร้อย

มาตรการที่ 2 การเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามชนิดของนม



บรรจุภัณฑ์

ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์



รถขนส่งเป็นห้องเย็น



ควรให้เด็กเริ่มดื่มนม

ภายในวันที่ตรวจรับนม หากไม่สามารถทำได้
ไม่ควรเกิน 10 วัน นับจากวันที่ผลิต



ตรวจสอบวันหมดอายุ

สุ่มตรวจคุณภาพนม
และไม่ให้นักเรียนใช้ปากกีดถุงนม
หรือดื่มนมจากถุงโดยตรง ควรใช้หลอดดูด

มาตรการที่ 3 การจัดเก็บอาหารบริจาคเป็นระบบ

| |
|-----------------------|
| วันที่ 1 สิงหาคม 2567 |
| ขนม 100 ชิ้น |
| ผลไม้ 100 ผล |
| นม 100 กล่อง |

มีการจัดเก็บข้อมูลอาหารบริจาค
เช่น รายการอาหาร วันเดือนปีที่บริจาค



1422

สายด่วนกรมควบคุมโรค



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

6

มาตรการป้องกัน โรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา



มาตรการที่ 4 การจัดการอาหารกรณีจัดกิจกรรม

เช่น กีฬาสี เจ้าภาพ ทัศนศึกษา




รับบริการน้ำสะอาด

การดำเนินงานเฝ้าระวังสุขภาพอาหาร
เช่น การให้ความรู้ผู้สัมผัสผู้บริการผู้ตรวจ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย



จัดเตรียมภาชนะอุปกรณ์ส่วนบุคคล

ให้เพียงพอสำหรับทุกคน
หรือใช้ภาชนะอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง



อาหารกล่อง

ไม่เลือกอาหารที่บูดเสียง่าย
ไม่ราดกับข้าวลงบนข้าวโดยตรง
ควรเลือกกับข้าวที่เป็นอาหารแห้ง

มาตรการที่ 5 การดำเนินการไปตลอดภัยจากพิษพิษ



พิษพิษในสถานศึกษา ต้องมีรั้วล้อม

มีป้ายชื่อและคำเตือนว่า "พิษพิษห้ามรับประทาน"



มีกิจกรรมเรียนรู้

เรื่องการป้องกันตัวเองจากพิษพิษ

มาตรการที่ 6 การประสานส่งต่อและการสื่อสารความเสี่ยง เมื่อพบเด็กป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ระบอบในสถานศึกษา

● มีแนวทางการส่งต่อเมื่อพบเด็กป่วย
หรือเกิดเหตุการณ์ระบอบในสถานศึกษา

● มีแผนกำกับที่ระบุผู้รับผิดชอบ
ชี้แจงต่อและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

● แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบอบในสถานศึกษา



● แยกห้องเรียนป่วย สังเกตอาการ
ดูแลจิตใจเด็กเบื้องต้น และแจ้งผู้ปกครอง

● มีการสื่อสารความเสี่ยงให้แก่
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู ภารโรง
และบุคลากรในสถานศึกษา

● มีการบันทึกภาวะสุขภาพนักเรียน
ในกรณีเจ็บป่วย ด้วยโรคอาหารเป็นพิษ